

Lycée Saint-Augustin

 T^{ale} spé Maths expertes J. BÉRARD

2025 - 2026

TD 2 Divers modes de raisonnement

1.
$$\min(x,y) = \frac{x+y-|x-y|}{2}$$
.

2.
$$\max(x,y) = \frac{x+y+|x-y|}{2}$$
.

Exercice 2 ($\bigstar \star \overleftrightarrow{x} \overleftrightarrow{x}$) Démontrer la propriété « $\forall n \in \mathbb{N}$, n et n^2 ont même parité », en utilisant différents types de preuves :

- 1. élémentaire directe (déduction ou équivalence);
- 2. par disjonction de cas;
- 3. par contraposée;
- 4. par l'absurde.

Exercice 3 ($\bigstar \bigstar$ Déterminer l'ensemble (noté D) des réels t tels que les nombres $\frac{t^2+2}{t^2-2}$ et $\frac{t-1}{t+1}$ sont bien définis, puis résoudre l'équation (d'inconnue $t \in D$):

$$\frac{t^2+2}{t^2-2} = \frac{t-1}{t+1}.$$

Exercice 4 ($\bigstar \bigstar \mathring{a} \mathring{a}$) Résoudre l'équation (d'inconnue s > -1):

$$s + \sqrt{s+1} = 5$$
.

Exercice 5 ($\bigstar \star \mathring{\Delta} \mathring{\Delta}$) Soit n_1 , n_2 , n_3 des entiers naturels vérifiant $n_1 + n_2 + n_3 = 30$. Montrer qu'au moins un de ces entiers est supérieur à 10.

Exercice 6 (★★★☆)

- 1. Montrer que le produit de deux entiers impairs est impair.
- 2. Montrer que réciproquement, si le produit de deux entiers est impair, alors ces deux entiers sont impairs.

Exercice 7 ($\bigstar \star \star \Leftrightarrow \circlearrowleft$) Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ qui vérifient :

$$\forall (m,n) \in \mathbb{N}^2, \quad f(m+n) = f(m) + f(n).$$

Exercice 8 ($\star\star\star\star$) L'objectif de cet exercice est de déterminer l'ensemble des fonctions $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ qui vérifient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) + x f(1 - x) = 1 + x \quad \text{(E1)}$$

- 1. Dans cette question, on suppose que f est une fonction solution, c'est-à-dire une fonction qui vérifie (E1).
 - a) Déterminer $f\left(\frac{1}{2}\right)$.
 - b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, f(1-x) + (1-x)f(x) = 2-x. On note cette égalité (E2).
 - c) À l'aide de (E1) et (E2), déterminer une expression de f(x) valable pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- 2. Donner la conclusion de l'exercice.